

PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE ÎN ROMÂNIA
PENTRU CULTURA DE TOMATE

FUNGICIDE

| Nr. crt. | Produs de protecție a plantelor | Agent dăunător | Doza |
|----------|--|---|--|
| 1. | ALLSTAR 250 SC | Phytophthora infestans (Mana tomatelor), Alternaria spp. (Alternarioza) | 0,75-1,0 L/ha (in functie de gradul de infestare) |
| 2. | AZUMO WG | Fainarea | 2,0 kg/ha |
| 3. | BOTECTOR | Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu) | 1,0 kg/ha |
| 4. | BOUILLIE BORDELAISE WDG | Pseudomonas tomato (patarea pustulara), Alternaria solani (alternarioza), Phytophthora infestans (mana), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor) | 0,75% (7,5 kg/ha) |
| 5. | CABRIO TOP | Mana, fainarea, patarea alba, patarea cafenie, patarea bruna | 1,5 - 2,0 kg/ha |
| 6. | CALIZI / (SINPRO - a doua denumire comerciala) | Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie | 0,8 l/ha |
| 7. | CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala) | Mana solanaceelor, patarea bruna | 0,15% (1,5 kg/ha) |
| 8. | CARIAL STAR | Mana, alternarioza | 0,6 l/ha pentru culturi în câmp și spații protejate |
| 9. | CASINO ROYALE | Alternaria spp. (Alternarioza) | 1,5 Kg/ha |
| 10. | CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala) | Basicarea fructelor, patarea pustulara | 2,0 kg/ha (0,2%) |
| 11. | CUPROFIX ULTRA / NOVICURE-a doua denumire comerciala | Mana, alternarioza, putregaiul radacinilor și fructelor, basicarea fructelor, patarea pustulara | 1,6-2,4 kg/ha |
| 12. | CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala) | Mana, Mana Mana | 3,0-4,0 l/ha 5,3 l/ha pentru culturi în spații protejate 53 ml/100 mp pentru culturi în spații protejate |
| 13. | CURENOX 50 | Phytophthora infestans (mana tomatelor), Alternaria solani (alternarioza) | 1,5-2,0 kg/ha |
| 14. | DAGONIS | Fainarea | 0,6 L/ha |
| | | Alternarioza, patarea cafenie | 1,0 L/ha |
| | | Fainarea | 0,6 L/ha |
| | | Alternarioza | 1,0 L/ha |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 15. | DIFCOR 250 EC | Alternarioza, putregaiul cenușiu, putregaiul alb | 0,5 l/ha |
| 16. | EQUATION PRO | Phytophthora infestans (mana tomatelor), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor) | 0,4 kg/ha |
| 17. | FLOSUL | Fainarea | 2,0 L/ha |
| 18. | FLOWBRIX / (COPPER-FIELD - a doua denumire comerciala) | Mana, agenti patogeni bacterieni | 2,6 ml/10 mp |
| | | Mana, agenti patogeni bacterien | 2.5 l/ha |
| 19. | FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala) | Mana tomatelor | 0,15% |
| | | Caderea rasadurilor | 0,15%(4-5 sol./mp) |
| | | Mana tomatelor | 0,15%(4-5 sol./mp) |
| | | Rizoctonioza | 0,15%(4-5 sol./mp) |
| 20. | KOCIDE 2000 | Mana, patarea pustulara | 2,0 kg/ha (0,2%) |
| 21. | LIETO / (ZETANIL - a doua denumire comerciala) | Mana | 0,40 kg/ha |
| 22. | MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala) | Mana tomatelor | 0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa) |
| 23. | ORIOUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW - a doua denumire comerciala) | Alternarioza | 0,05% (0,5 L/ha in 1000 L apa) |
| 24. | POLYRAM DF | Patarea cafenie a tomatelor, alternarioza, mana tomatelor, patarea alba a frunzelor de tomate | 0,2% |
| 25. | PROPLANT 72,2 SL | Mana de sol a tomatelor | 0,15-0,25% (3-5 l sol./m2) |
| | | Mana tomatelor | 0,15-0,25% (1,5-2,5 l/ha) |
| | | Căderea plăntuțelor | 0,15-0,25% (3-5 l sol./m2) |
| 26. | PYRUS 400 SC / (PAPYRUS 400 SC - a doua denumire comerciala) | Putregaiul cenușiu | 0,15% (1,5 l/ha) |
| 27. | REFLECT | Fainarea | 1,0 l/ha se aplica la culturi in sere si solarii |
| 28. | SCALA | Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu) | 2,0 L/ha |
| 29. | SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala) | Alternarioza (patarea bruna) | 0,5 L/ha |
| 30. | SIGNUM / (SYREX STAR -doua denumire comerciala) | Putregaiul cenușiu, fainarea | 1,5 kg/ha |
| 31. | SULBARI | Leveillula taurica (fainarea) | 5,0 kg/ha |
| 32. | SWITCH 62,5 WG | Putregaiul cenușiu | 0,8-1,0 kg/ha |
| 33. | VINCARE 51,7 WG | Mana tomatelor | 1,6-2,0 kg/ha |
| 34. | ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala) | Phytophthora infestans (Mana tomatelor) | 3,75-5,0 kg/ha |
| | | Alternaria solani (Alternarioza) | 3,75-5,0 kg/ha |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 35. | DOMARK 10 EC | Fainarea | 0,4 L/ha (0,04%) |
| 36. | REVUS 250 SC | Mana tomatelor | 0,6 l/ha |
| | | Phytophthora infestans (mana tomatelor) | 0,6 L/ha |
| 37. | VITRA 50 WP / (CUPRIDIN - a doua denumire comerciala) | Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate | 1,5-2,0 kg/ha |
| 38. | CYCLO-R LIQUIDO | Mana tomatelor | 2,4-4,0 l/ha |
| 39. | KANTAREL | Fainarea (sera) | 0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%) |
| 40. | OMIX / (EDEGAL - a doua denumire comerciala) | Mana, caderea plantutelor | 300 mL/ m ³ /substrat |
| | | Mana, caderea plantutelor | 5-6 mL/mp |
| 41. | COPFORCE EXTRA / (CUPMAN - a doua denumire comerciala) | Mana, alternarioza | 2,0 kg/ha |
| 42. | CUPERTINE SUPER / (COMBIDUO COBRE - a doua denumire comerciala) | Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana | 3,5 kg/ha |
| | | Mana tomatelor | 3,5 kg/ha |
| 43. | TAEGRO | Mana tomatelor | 0,37 kg/ha |
| | | Mana tomatelor, fainarea, patarea bruna a frunzelor de tomate (alternarioza) | 0,37 kg/ha |
| 44. | THIOVIT JET 80 WG | Fainarea (efect secundar asupra acarienilor) | 5,0 kg/ha |
| 45. | ARMETIL COBRE / (MANOXIN COMBI-a doua denumire comerciala) | Mana tomatelor | 2,5 kg/ha |
| 46. | REVUS 250 SC | Mana tomatelor | 0,6 l/ha |
| | | Phytophthora infestans (mana tomatelor) | 0,6 L/ha |
| 47. | LUNA PRIVILEGE 500 SC | Putregaiul cenusiu | 0,5 l/ha (0,05%) |
| 48. | LUNA SENSATION 500 SC | Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu) | 0,6 L/ha |
| 49. | FYTOSAVE | Leveillula taurica (Fainare) | 2,0 L/ha |
| 50. | LEGADO / (DIAGONAL - a doua denumire comerciala) | Fainarea | 0,8 l/ha |
| 51. | EVALIA / (TAZER - a doua denumire comerciala) | Mana, fainarea, alternarioza | 0,05-0,08% (50-80 ml/100 l apa) |
| 52. | PREVICUR ENERGY | Mana, caderea plantutelor, spatii protejate | 3 L/ha tratament aplicat prin picurare |
| | | Mana, caderea plantutelor, spatii protejate | 3 mL/mp tratament aplicat la sol |
| 53. | SERENADE ASO | Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu), Pseudomonas syringae (patarea pustulara a fructelor), Xanthomonas spp. (patarea bacteriana a frunzelor) | 4,0-8,0 L/ha |
| | | Fusarium oxysporum (fusarioza) | 10,0 L/ha |

| | | | |
|-----|------------------------|--|--|
| 54. | TELDOR 500 SC | Putregaiul cenușiu, spații protejate | 0,8 L/ha |
| 55. | TRIUMF 40 WG | Mana, spații protejate | 2,0-2,5 kg/ha |
| 56. | BASAMID GRANULE | Mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculară | 500 kg/ha |
| 57. | SONATA | Leveillula taurica (fainarea), Oidium lycopersici (fainarea) | 5,0-10,0 L/ha |
| 58. | T34 BIOCONTROL | Caderea plantelor | 0,5 g/mp de substrat până la 5 cm adâncime |
| | | Caderea plantelor | 0,01 g/l sol sau substrat sau 0,005g/l+0,005 g/l |
| | | Caderea plantelor | 10 g/ m ³ de substrat |

INSECTICIDE

| Nr. crt. | Produs de protecție a plantelor | Agent dăunător | Doza |
|----------|---|---|--|
| 1. | AFFIRM | Minierul frunzelor de tomate, omida fructelor | 1,5 kg/ha |
| 2. | AVAUNT 150 EC | Omida fructelor de tomate, omida sfecei | 0,250 l/ha în câmp și spații protejate) |
| 3. | BELTHIRUL | Omizile fructelor | 0,25-0,50 kg/ha (800-1000 l apa/ha) |
| 4. | COLUMBO 0,8 MG | Viermii sarma, buha sematurilor | 12 kg/ha |
| 5. | CORAGEN | Omida fructelor, molia tomatelor | 175 ml/ha |
| 6. | COROCID SUPER | Coropisnita | 20 kg/ha |
| 7. | ERCOLE | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha |
| 8. | FLORAMITE 240 SC | Paianjenii | 0,4-0,6 l/ha |
| 9. | FURY GEO | Viermii sarma | 12-15 kg/ha |
| 10. | LEBRON 0,5 G | Viermii sarma, buha sematurilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai | 15-20 kg/ha |
| 11. | MICROSED GEO / (SOBEK UP - a doua denumire comerciala) | Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp. (buha), Chaetocnema tibialis (puricele sfecei), Ceutorhynchus pleurostigma (gargarita), Blaniulus guttulatus (sarpele orb, miriapod), Hylemya spp. (muste), Chamaepsila rosae (musca morcovului), Tipula spp. (tânțari) | 16-20 kg/ha se aplica prin incorporare la semant sau transplantare |
| 12. | PLINTO 2,5 EC / (ALFASURE 2,5 EC - a doua denumire comerciala) | Omida fructelor, buha gama | 0,4-0,6 l/ha |
| 13. | POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala) | Afide, tripsi, musculita alba de seara | 30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %) |
| 14. | TRIKA EXPERT | Buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 15. | ALVERDE | Omida fructificațiilor, larve L1-L3 | 0,1 % (1,0 l/ha/1000 l apa) |
| 16. | SIVANTO PRIME 200 SL | Afide (Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae); Musculițe (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) | 0,56 L/ha |
| 17. | VOLIAM TARGO | Omida fructelor, buha legumelor | 0,8 L/ha |
| 18. | GRIAL / (DIEDRO - a doua denumire comerciala) | Afide, omizi | 0,5 L/ha (50-166 mL/hL) |
| 19. | VERTIMEC PRO | Păianjeni, acarieni, tripsi, muste | 1,2 l/ha |
| 20. | MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala) | Tripsul californian | 0,04% |
| 21. | FASTER 10 CE | Păduchele verde | 0,02% (0,2 l/ha) |
| 22. | VYDATE 10 L | Nematozi (nematodul tulpinilor si bulbilor, nematozii cu chisti, nematozii galicoli, Pratylenchus, Tylenchulus) Insecte (omida miniera, musculita alba de sera, afide, musculita tutunului, paduchele verde al piersicului, tripsul tutunului) Nematodul galicol al radacinilor, musculita alba de sera, musca minieră a solanaceelor | 10 L/ha,câmp 10 L/ha, sera si solarii |
| 23. | VYDATE 10 G | Musulita alba de sera, nematozii galicoli, nematodul tulpinilor | 30,0-55,0 kg/ha, câmp, sera si solarii |
| 24. | LIMOCIDE | Thrips tabaci Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera) | 4,0 L/ha,sere 2,0 L/ha ,sere |
| 25. | FLIPPER | Afide, musculita alba de sera, acarieni Afide, musculita alba de sera, acarieni | 20,0 L/ha, câmp 16,0 L/ha, spații protejate) |
| 26. | APACHE / (VERTAB - a doua denumire comerciala) | Musca miniera,seră Musca miniera, câmp Acarianul rosu comun, acarianul lat, câmp | 0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel 0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) 0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) |
| 27. | AZATIN EC | Afide,Trialeurodes vaporariorum, Leptinotarsa decemlineata, Liriomyza spp., Noctuide (Trichoplusia ni, Helicoverpa armigera, Autographa gamma, Mamestra brassicae, Spodoptera exigua), Tripsi, Tuta absoluta | 1,0 - 1,5 L /ha, sere Se aplică la avertizare. |
| 28. | BACTOSPEINE DF / (DIPEL DF - a doua denumire comerciala) | Omida fructelor, buha sfecelei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha , sere |
| 29. | BERMECTINE | Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid Molia tomatelor Muste | 0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), sere 1,0 L/ha (100 mL/hL), sere 0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), sere |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele | 0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL) , câmp |
| 30. | PREV GOLD | Acarieni (Tetranychus urticae), Musculita alba (Trialeurodes aporariorum) | 0,4-0,8% (maxim 8 L/ha) |
| 31. | SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala) | Musca miniera | 0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inlforitului. |
| 32. | HARPUN | Musculita alba de sera | 75 ml/100 L apa , solarii |
| 33. | JUVINAL 10 EC | Musculita alba de sera | 0,05% , solarii |
| 34. | DELTAM | Afide | 8,0 mL in 10 L apa/100 mp |
| | | Omizi defoliatoare | 5,0 mL in 10 L apa/100 mp |
| 35. | MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala) | Helicoverpa armigera(Omida fructelor), Macrosiphon euphorbiae (Paduchele verde al solanaceelor) | 0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apa) |
| 36. | VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua dnumire comeciala) | Omida capsulelor (larve L1 - L2) | 0,02 % (0,2 l p.c. /ha) |
| 37. | VERTIMEC 1,8% EC | Acarieni | 60 mL/hl , câmp |
| | | Musca miniera | 60-80 mL/hl , sera |
| | | Acarieni, tripsul californian, musca miniera, trpsul comun, acarieni galicoli, | 60-80 mL/hl , spații protejate |
| 38. | LASER 240 SC | Musca miniera a solanaceelor | 0,05% |
| 39. | SANIUM SYSTEM | Afide (Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae); Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera) | 4,5 L/ha , sere și solarii |
| 40. | MINECTO ALPHA | Tripsul californian, musculita alba de sera, omizi defoliatoare, omida fructelor, musca miniera, molia tomatelor | 1,0-1,25 L/ha (1,0 L/ha-irigare prin picurare sau 1,25 L/ha-pulverizare) |
| 41. | NOFLY WP | Musculita alba de sera | 200-250 g/hl |
| 42. | REQUIEM PRIME | Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului, tripsul californian, acarianul rosu comun | 0,65 % maxim 10 L/ha |
| 43. | SANMITE 10 SC | Paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului | 1,5 L/ha |
| 44. | SPRUZIT | Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide) | 6,0 L/ha in 600 L apa (talie plantei <50 cm) |
| | | Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide) | 9,0 L/ha in 900 L apa (talie plantei 50-125 cm) |
| | | Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide) | 12,0 L/ha in 1200 L apa (talie plantei >125 cm) |
| 45. | CYPERGUARD 25 EC / (FOSTOC - a doua denumire comerciala) | Paduchele solanaceelor, gandacul din Colorado | 0,008% |

| | | | |
|-----|---------------|--|-----------|
| 46. | DELMUR | Aphis gossypii ,Macrosiphum euphorbiae , Myzus persicae ,Helicoverpa armigera , Spodoptera sp.,Spodoptera exigua , Spodoptera littoralis, Agrotis segetum, Heliothis sp., Chrysodeixis calcite, Autographa gamma, Tuta absoluta. | 500 mL/ha |
|-----|---------------|--|-----------|

ACARICIDE

| Nr. crt. | Produs de protecție a plantelor | Agent dăunător | Doza |
|----------|---------------------------------|--|---|
| 1. | NISSORUN 10 WP | Acarianul rosu comun | 1,0 kg/ha |
| 2. | KANEMITE SC | Paianjenul rosu comun | In spatii protejate 1,25 L/ha in 1200 L apa |
| 3. | MOVENTO 100 SC | Tetranychus urticae (Acarianul roșu comun) | 0,75 L/ha |
| 4. | VERTIGO 018 EC | Acarianul stacojiu | 0,05 % |

ERBICIDE

| Nr. crt. | Produs de protecție a plantelor | Agent dăunător | Doza |
|----------|--|--|--|
| 1. | BUZZIN | Buruieni dicotiledonate si unele monocotiledonate | 0,50 kg/ha aplicat la plantare |
| 2. | MATECOR EXPRESS | Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: teisor, stir, scanteiuta, spanac salbatic, meisor, iarba barboasa, euforbia, fumarita, sugel puturos, raigras, musetelul, firuta, hrisca, grasita, mohor, mustar salbatic, susai, rocoina, urzica, ventrili | 0,4 kg/ha Se aplica pretransplantare |
| | | Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: teisor, stir, scanteiuta, spanac salbatic, meisor, iarba barboasa, euforbia, fumarita, sugel puturos, raigras, musetelul, firuta, hrisca, grasita, mohor, mustar salbatic, susai, rocoina, urzica, ventrili | 0,4-0,75 kg/ha Se aplica post rasarire si post-transplantare ,stadiul de 8-9 frunze(BBCH 18-19) |
| 3. | SHARPEN 40 SC / (PENDISOL 40 SC - a doua denumire comerciala) | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 3,3-4,1 l/ha se aplica preemergent cu 2-3 zile inainte de plantare |
| 4. | STOMP AQUA / (PROWL AQUA - a doua denumire comerciala) | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate | 1,0-3,0 l/ha inaintea transplantarii |
| 5. | STRATOS ULTRA / | Buruieni monocotiledonate perene | 4 L/ha (aplicat singur) |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | (FOCUS - a doua denumire comerciala) | | Postemergent 2L/ha+2L/ha adjuvant (DASH) Postemergent |
| | | Buruieni monocotiledonate perene | 1-2 L/ha (aplicat singur) Postemergent |
| | | Buruieni monocotiledonate anuale | 2L/ha+2L/ha adjuvant (DASH) Postemergent |
| 6. | TARGA MAX / (GRAMIN MAX - a doua denumire comerciala) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,4-0,6 l/ha Postemergent, buruieni monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Shorgum halepense pana la 15-25 cm, Agropyron repens sub 20 cm |
| | | Buruieni monocotiledonate perene | 0,6-1,25 l/ha Postemergent, buruieni monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Shorgum halepense pana la 15-25 cm, Agropyron repens sub 20 cm |
| 7. | WISH TOP / (QUICK FORTE - a doua denumire comerciala) | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 0,83-1,25 L/ha |
| 8. | SENCOR LIQUID 600 SC | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 0,45 l/ha Preemergent Tomate semanate |
| | | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 0,35 l/ha Postemergent (la minim 40 de zile de la tratamentul in preemergență. Tomate semanate |
| | | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate | 0,6 l/ha Preemergent, Tomate transplantate |
| 9. | FUSILADE FORTE | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha Tomate semanate direct in camp |
| | | Buruieni monocotiledonate perene | 1,0 l/ha Tomate semanate direct in camp |
| | | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha postemergent Tomate transplantate |
| | | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha postemergent Tomate transplantate |
| 10. | DEVRIKOL 45 F | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 3,0-4,0 L/ha se aplica inainte de semanat cu incorporare Tomate semanate direct in camp |
| 11. | DUAL GOLD 960 EC / (TENDER-a doua denumire comerciala) | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic) | 1,0 l/ha Preemergent Tomate in camp (cultura infiintata prin rasad) |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 12. | METOS 960 EC | Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate (Setaria, Galinsoga) | 1,0 L/ha Se aplica preemergent Tomate transpl., tomate semănate direct in camp. |
| 13. | AGIL 100 EC / (ZETROLA - a doua denumire comerciala) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 L/ha ,postemergent Tomate transplantate |
| | | Costrei din rizomi | 1,0 L/ha ,postemergent Tomate transplantate |
| 14. | METRIPHAR 70 WG | Buruieni dicotiledonate `si unele monocotiledonate | 0,3 kg/ha Tomate transplantate |
| 15. | PANTERA 40 EC / (RANGO - a doua denumire comerciala) | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,75 l/ha postemergent Tomate transplantate |
| 16. | TARGA SUPER 5 EC | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,0 l/ha postemergent Tomate transplantate |
| 17. | TITUS 25 DF / (TAROT - a doua denumire comerciala) | Buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele dicotiledonate | 40-60 g/ha +Trend90, 0,1 % surfactant Postemergent Se aplica primăvara de la prima frunză până la prima inflorescență a culturii (BBCH 11-51) |

REGULATORI DE CREȘTERE

| Nr. crt. | Produs de protecție a plantelor | Agent dăunător | Doza |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | ATONIK | Obținerea de spor de producție | 0,5 l/ha Se aplica de la apariția primelor inflorescențe până la apariția primelor fructe (BBCH 51-71) |
| 2. | SmartFresh ProTabs | Regulator de creștere | 0,084 g/ m ³ - se aplica nu mai tarziu de 24 de ore, după recoltare |
| 3. | PLANTLINE E4 | Combaterea maturizării neuniforme | 0,0125 L/m ³ Se aplica la sfârșitul ciclului de producție, timp de 6 săptămâni, noaptea, prin fumigare. Tomate spații protejate |
| | | | |

NEMATOCIDE , TRATAMENT SOL

| Nr. crt. | Produs de protecție a plantelor | Agent dăunător | Doza |
|----------|---------------------------------|---|---|
| 1. | AFROMYL | Nematozi | 10,0 L/ha Se aplica la plantare / transplantare |
| 2. | BASAMID GRANULE | Nematodul galicol al radacinilor | 500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de plantare |
| 3. | NEMATHORIN 10 G | Nematodul galicol al radacinilor | 15 kg/ha Tomate sera si solarii |
| 4. | NEMASOL 510 | Patogeni, nematozi, buruieni | 700 L/ha -se aplica inainte de plantarea rasadurilor Tomate sera |
| 5. | TERVIGO | Nematozii galicoli | 5,0 L/ha Tomate spatii protejate |
| 6. | VELUM PRIME 400 SC | Meloidogyne sp. (Nematozi), Leveillula taurica (Fainare) | 625 mL/ha Tomate sera si solarii |
| 7. | VYDATE 10 L | Nematozi (nematodul tulpinilor si bulbilor, nematozii cu chisti, nematozii galicoli, Pratylenchus, Tylenchulus) Insecte (omida miniera, musculita alba de sera, afide, musculita tutunului, paduchele verde al piersicului, tripsul tutunului) | 10 L/ha |
| | | Nematodul galicol al radacinilor, musculita alba de sera, musca minieră a solanaceelor | 10 L/ha Tomate sera si solarii |

Rodenticide, Moluscocide

| Nr. crt. | Produs de protecție a plantelor | Agent dăunător | Doza |
|----------|---------------------------------|---|---|
| 1. | IRONMAX PRO | Limacși | 7,0 kg/ha Tomate seră |
| 2. | AGROSAN B | Melcii fără cochilie | 15 kg/ha(administrare pe sol, fără incorporare) Tomate in camp |
| 3. | SLUXX HP | Melci fără cochilie (limacși); Melci cu cochilie | 7,0 kg/ha Se aplică uniform pe sol, la începutul infestării. |
| 4. | ARVALIN | Șoarecele de câmp | 5 bucăți/galerie |